

## 第三章 内积空间

### 1 欧式空间

约定: 在本节中  $V$  是实数域  $\mathbb{R}$  上的有限维线性空间.

#### 1.1 $V$ 上的内积

**定义 1.1** 设  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  是  $V$  上的双线性型满足  $f(\mathbf{x}, \mathbf{x})$  是正定的. 则称  $(V, f)$  是一个欧式空间,  $f$  是  $V$  上的内积.

**例 1.2 (标准欧式空间)** 设  $V = \mathbb{R}^n$ ,

$$\begin{aligned} f : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\mapsto \mathbf{x}^t \mathbf{y}. \end{aligned}$$

注意到  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^t E \mathbf{y}$ . 于是,  $f$  是  $\mathbb{R}^n$  对称双线性型, 且  $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \mathbf{x}^t \mathbf{x}$  是正定的. 于是,  $(V, f)$  是欧式空间.

**例 1.3** 设  $V = M_n(\mathbb{R})$ ,

$$\begin{aligned} f : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (X, Y) &\mapsto \text{tr}(X^t Y). \end{aligned}$$

下面我们来验证  $f$  是  $V$  上的内积.

首先设  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $A, B \in V$ ,

$$\begin{aligned}
f(\alpha A + \beta B, Y) &= \text{tr}((\alpha A + \beta B)^t Y) && (f \text{ 的定义}) \\
&= \text{tr}((\alpha A^t + \beta B^t) Y) && (\text{转置的性质}) \\
&= \text{tr}(\alpha(A^t Y) + \beta(B^t Y)) && (\text{矩阵乘法分配律}) \\
&= \alpha \text{tr}(A^t Y) + \beta \text{tr}(B^t Y) && (\text{tr 是线性函数}) \\
&= \alpha f(A, Y) + \beta f(B, Y) && (f \text{ 的定义}).
\end{aligned}$$

于是,  $f$  关于第一个变元是线性的. 类似地可验证  $f$  关于第二个变元也是线性的. 故  $f$  是双线性型. 注意到

$$f(Y, X) = \text{tr}(Y^t X) = \text{tr}((Y^t X)^t) = \text{tr}(X^t Y) = f(X, Y).$$

于是,  $f$  是对称的. 设  $X = (x_{i,j}) \neq O$ . 则

$$f(X, X) = X^t X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{i,j}^2 > 0.$$

于是,  $f(X, X)$  是正定的. 由此得出  $(V, f)$  是欧式空间.

**例 1.4** 设  $V = \mathbb{R}[x]^{(n)}$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  且  $a < b$ .

$$\begin{aligned}
\phi : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(f, g) &\mapsto \int_a^b f(x)g(x) dx.
\end{aligned}$$

下面我们来验证  $\phi$  是  $V$  上的内积. 首先设  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$p, q \in V$ ,

$$\begin{aligned}
\phi(\alpha p + \beta q, g) &= \int_a^b (\alpha p(x) + \beta q(x))g(x)dx \quad (\phi \text{ 的定义}) \\
&= \alpha \int_a^b p(x)g(x)dx + \beta \int_a^b q(x)g(x)dx \quad (\int_a^b \text{ 线性}) \\
&= \alpha f(p, g) + \beta f(q, g) \quad (f \text{ 的定义}).
\end{aligned}$$

于是,  $\phi$  关于第一个变元是线性的. 类似地可验证  $\phi$  关于第二个变元也是线性的. 故  $\phi$  是双线性型.  $\phi$  显然是对称的. 设  $f \in R[x]^{(n)} \setminus \{0\}$ ,

$$\phi(f, f) = \int_a^b f(x)^2 dx > 0.$$

于是,  $\phi(f, f)$  是正定的. 由此得出  $(V, \phi)$  是欧式空间.

我们把欧式空间  $V$  上的内积记为  $(|)$ . 即

$$\begin{aligned}
(|) : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\mapsto (\mathbf{x}|\mathbf{y}).
\end{aligned}$$

利用上述符号, 内积的基本性质如下:

(i) (双线性) 对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,

$$(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} | \mathbf{z}) = \alpha (\mathbf{x} | \mathbf{z}) + \beta (\mathbf{y} | \mathbf{z}), \quad (\mathbf{x} | \alpha \mathbf{y} + \beta \mathbf{z}) = \alpha (\mathbf{x} | \mathbf{y}) + \beta (\mathbf{x} | \mathbf{z}).$$

(ii) (对称性) 对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ ,

$$(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = (\mathbf{y} | \mathbf{x}).$$

(iii) (正定性) 对任意  $\mathbf{x} \in V$ ,

$$(\mathbf{x}|\mathbf{x}) \geq 0 \quad \text{且} \quad (\mathbf{x}|\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

**定义 1.5** 设  $V$  是欧式空间,  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ . 定义

$$G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) = ((\mathbf{v}_i|\mathbf{v}_j))_{m \times m}.$$

称之为  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$  的 Gram 矩阵.

由内积的对称性可知  $G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$  是对称的.

**命题 1.6** 设  $V$  是欧式空间,  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ . 则  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$  线性相关当且仅当

$$\text{rank}(G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)) < m.$$

**证明.** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$  使得

$$G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

上述方程组等价于

$$\sum_{j=1}^m \alpha_j (\mathbf{v}_i|\mathbf{v}_j) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

由此得出等价条件:

$$(\mathbf{v}_i | \underbrace{\sum_{j=1}^m \alpha_j \mathbf{v}_j}_{\mathbf{w}}) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \quad (2)$$

若  $\text{rank}(G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)) < m$ , 则存在  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ , 不全为零, 使得 (1) 成立. (见上学期第二章第三讲推论 4.2). 于是, (2) 成立. 由此得出

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i (\mathbf{v}_i | \mathbf{w}) = \left( \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i | \mathbf{w} \right) = (\mathbf{w} | \mathbf{w}) = 0.$$

故  $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ . 从而  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$  线性相关.

反之, 设  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$  线性相关. 则存在  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ , 不全为零, 使得  $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ . 于是, (2) 成立. 那么, (1) 成立. 由此得出  $\text{rank}(G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)) < m$  (上学期第二章第三讲推论 4.2).  $\square$

**命题 1.7** 设  $V$  是欧式空间,  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ . 令  $\mathbf{w} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_m \mathbf{v}_m$ . 则

$$(\mathbf{w} | \mathbf{w}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}.$$

证明. 利用内积的双线性性得出

$$\begin{aligned} (\mathbf{w} | \mathbf{w}) &= \left( \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{v}_i \mid \sum_{j=1}^m \alpha_j \mathbf{v}_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \alpha_j (\mathbf{v}_i | \mathbf{v}_j) \\ &= (\alpha_1, \dots, \alpha_m) G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}. \quad \square \end{aligned}$$

**注解 1.8** 由上述两个命题可知,  $G(v_1, \dots, v_m)$  是半正定的. 它是正定的当且仅当  $v_1, \dots, v_m$  线性无关.

## 1.2 长度、距离、角度和正交

**定义 1.9** 设  $V$  是欧式空间,  $x \in V$ . 称  $\sqrt{(x|x)}$  是  $x$  的长度, 记为  $\|x\|$ . 再设  $y \in V$ . 则  $\|x - y\|$  称为  $x$  到  $y$  之间的距离.

由内积的正定性可知,  $\|x\|$  是良定义的且  $\|x\| = 0$  当且仅当  $x = \mathbf{0}$ . 从而,  $x = y$  等且仅当  $\|x - y\| = 0$ . 由双线性可知  $\|x\| = \| - x\|$ . 从而,  $\|x - y\| = \|y - x\|$ .

**定理 1.10** 设  $x, y \in V$ . 则  $|(x|y)| \leq \|x\|\|y\|$  (*Cauchy-Bunyakovski 不等式*). 特别地,  $|(x|y)| = \|x\|\|y\|$  当且仅当  $x, y$  线性相关.

**证明.** 当  $x = \mathbf{0}$  或  $y = \mathbf{0}$  时定理中的结论显然成立. 设  $y \neq \mathbf{0}$  和  $\lambda$  是任意实数. 则  $(x + \lambda y|x + \lambda y) \geq 0$ . 利用双线性和对称性得

$$(x + \lambda y|x + \lambda y) = (y|y)\lambda^2 + 2(x|y)\lambda + (x|x) \geq 0.$$

于是,  $\Delta := 4(x|y)^2 - 4(y|y)(x|y) \leq 0$ . 由此得出

$$(x|y)^2 \leq (y|y)(x|y) \implies |(x|y)| \leq \|x\|\|y\|.$$

注意到  $|\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle| = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$  当且仅当  $\Delta = 0$  当且仅当存在  $\lambda \in \mathbb{R}$  使得

$$(\mathbf{x} + \lambda \mathbf{y} | \mathbf{x} + \lambda \mathbf{y}) = 0.$$

这结论等价于  $\mathbf{x} + \lambda \mathbf{y} = \mathbf{0}$  (内积正定性). 在  $\mathbf{y} \neq 0$  得条件下, 上述结论等价于  $\mathbf{x}$  和  $\mathbf{y}$  线性相关.  $\square$

**例 1.11** 在标准欧式空间中, *Cauchy-Bunyakovski 不等式* 是对任意  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$

$$|x_1 y_1 + \dots + x_n y_n| \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2}.$$

在例 1.3 定义的矩阵欧式空间中, *Cauchy-Bunyakovski 不等式* 是对任意  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ,

$$|\text{tr}(A^t B)| \leq \sqrt{\text{tr}(A^t A)} \sqrt{\text{tr}(B^t B)}.$$

在例 1.4 定义的多项式欧式空间中, *Cauchy-Bunyakovski 不等式* 是对任意  $f, g \in \mathbb{R}[x]^{(n)}$ ,

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx} \sqrt{\int_a^b g(x)^2 dx}.$$

设  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ , 且存在  $\alpha \in \mathbb{R}$  使得  $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{y}$  或  $\mathbf{y} = \alpha \mathbf{x}$ . 则称  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  平行. 如果  $\alpha \geq 0$ , 则称  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  同向. 如果  $\alpha \leq 0$ , 则称  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  反向. 有时也称  $\mathbf{0}$  是迷向的.

**推论 1.12** 设  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ . 则  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ . 等式成立等且仅当  $\mathbf{x}$  和  $\mathbf{y}$  同向.

证明. 我们计算

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= (\mathbf{x} + \mathbf{y} | \mathbf{x} + \mathbf{y}) && \text{(长度的定义)} \\
 &= (\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (\mathbf{y}, \mathbf{y}) && \text{(双线性和对称性)} \\
 &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2(\mathbf{x} | \mathbf{y}) + \|\mathbf{y}\|^2 && \text{(长度的定义)} \\
 &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 && \text{(Cauchy-Bunyakovski)} \\
 &= (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.
 \end{aligned}$$

于是,  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ .

下面验证等式成立的充要条件. 不妨设  $\mathbf{y} \neq 0$ . 由上面计算可知等式成立当且仅当  $(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|$ . 根据定理 1.10, 此时存在  $\alpha \in \mathbb{R}$  使得  $\mathbf{x} = \alpha\mathbf{y}$ . 于是,  $(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|$  等价于  $(\alpha\mathbf{y} | \mathbf{y}) = \|\alpha\mathbf{y}\|\|\mathbf{y}\|$ , 即  $\alpha\|\mathbf{y}\|^2 = |\alpha|\|\mathbf{y}\|^2$ . 换言之,  $\alpha = |\alpha|$ . 即  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  同向.  $\square$

设  $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ . 如果  $\|\mathbf{x}\| = 1$ , 则称  $\mathbf{x}$  是单位向量. 设  $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ . 则  $\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$  是与  $\mathbf{v}$  同向的单位向量, 称为  $\mathbf{v}$  的单位化向量.

**定义 1.13** 设  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ . 称

$$\arccos \left( \frac{(\mathbf{x} | \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|} \right)$$

是  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  的夹角.

根据 Cauchy-Bunyakovski 不等式, 夹角是良定义的. 它的通常取值范围是  $[0, \pi]$ .

**定义 1.14** 设  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ . 如果  $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = 0$ , 则称  $\mathbf{x}$  和  $\mathbf{y}$  正交, 记为  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ .

零向量与任何向量都正交.

**引理 1.15** 设  $\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in V$ , 其中  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$  非零.

$$(i) \quad \mathbf{x} \perp \mathbf{x} \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

(ii) 如果  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$  两两正交, 则它们线性无关.

**证明.** (i) 注意到

$$(\mathbf{x}|\mathbf{x}) = 0 \iff \|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

(ii) 因为对任意  $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$  满足  $i \neq j$ , 我们有  $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = 0$ , 所以  $\mathbf{G}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k) = \text{diag}((\mathbf{x}_1|\mathbf{x}_1), \dots, (\mathbf{x}_k|\mathbf{x}_k))$ . 因为对任意  $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ ,  $(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_i) \neq 0$ , 所以

$$\text{rank}(\mathbf{G}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k)) = k.$$

根据命题 1.6,  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$  线性无关.  $\square$

**例 1.16 (勾股定理)** 设  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ . 证明  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$  当且仅当

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

证明. 因为  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2(\mathbf{x}|\mathbf{y}) + \|\mathbf{y}\|^2$ , 所以

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$$

当且仅当  $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = 0$ , 即  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ .  $\square$