

第三章 内积空间

10 Hermitian 空间简介

回忆: $\mathbb{C} = \{x + y\sqrt{-1} | x, y \in \mathbb{R}\}$. 设 $z = x + y\sqrt{-1}$. 则 $\bar{z} = x - y\sqrt{-1}$ 是 z 的共轭.

1. 共轭映射 $\bar{\cdot} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是自同构;
2. 设 $z \in \mathbb{C}$. 则 $z\bar{z}$ 是非负实数; $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$;
3. 设 $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{C}$, $z_1\bar{z}_1 + \dots + z_k\bar{z}_k \geq 0$; 且

$$z_1\bar{z}_1 + \dots + z_k\bar{z}_k = 0 \iff z_1 = \dots = z_k = 0.$$

4. 设 $f \in \mathbb{C}[t] \setminus \mathbb{C}$. 则 f 是 $\mathbb{C}[t]$ 中一次多项式的乘积.

记号. 在本节中 V 是 \mathbb{C} 上 n 维线性空间.

10.1 半双线性型

定义 10.1 设 $f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$. 如果对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 我们有

$$f(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}, \mathbf{z}) = \alpha f(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \beta f(\mathbf{y}, \mathbf{z})$$

和

$$f(\mathbf{x}, \alpha\mathbf{y} + \beta\mathbf{z}) = \bar{\alpha} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \bar{\beta} f(\mathbf{x}, \mathbf{z}),$$

则称 f 是 V 上的半双线性型.

设 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基. 矩阵 $A = (f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{n \times n}$ 称为 f 在 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵. 设 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$ 和 $\mathbf{y} = y_1\mathbf{e}_1 + \dots + y_n\mathbf{e}_n$. 则

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1, \dots, x_n)A(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)^t.$$

验证:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= f\left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \mathbf{y}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i f\left(\mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \bar{y}_j f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \\ &= (x_1, \dots, x_n)A \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \vdots \\ \bar{y}_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

如果对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, $f(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = \overline{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$, 则半双线性型 f 称为是 *Hermitian* 型的.

对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, A 的共轭转置是指矩阵 \bar{A}^t , 其中 \bar{A} 是把 A 中元素都取共轭得到的矩阵. 记 A 的共轭转置为 A^* . 如果 $A = A^*$, 则称 A 是 *Hermitian* 型的.

命题 10.2 设 f 是 V 上半双线性型, 矩阵 $A = (f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{n \times n}$ 是 f 在 V 的基底 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵. 则 f 是 *Hermitian* 型的当且仅当 A 是 *Hermitian* 型.

证明. 设 f 是 *Hermitian* 的. 则

$$A^* = (\overline{f(\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i)}) = (f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)) = A.$$

故 A 是 *Hermitian* 的.

反之, 设 A 是 *Hermitian* 的. 则对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$,

$$\begin{aligned} \overline{f(\mathbf{x}, \mathbf{y})} &= \overline{(x_1, \dots, x_n)A(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)^t} \\ &= \overline{(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)A^t(x_1, \dots, x_n)^t} \\ &= (y_1, \dots, y_n)A^*(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)^t \\ &= f(\mathbf{y}, \mathbf{x}). \quad \square \end{aligned}$$

注解 10.3 设 f 是 *Hermitian* 半双线性型. 则

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \overline{f(\mathbf{x}, \mathbf{x})}.$$

于是, $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}$.

定义 10.4 设 f 是 *Hermitian* 半双线性型. 如果对于任意 $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$, 我们有 $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}) > 0$, 则称 f 是正定的. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是 *Hermitian* 型.

如果对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ 我们有 $\mathbf{x}^t A \bar{\mathbf{x}} > 0$. 则称 A 是正定的.

命题 10.5 设 f 是半双线性型, $A = (f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{n \times n}$ 是 f 在 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵. 则 f 是正定的当且仅当 A 是正定的.

10.2 Hermitian 空间

设 f 是 V 上的正定半双线性型. 则 (V, f) 称为 *Hermitian* 空间或酉空间. 通常把 f 记为 $(|)$. 我们有

1. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$,

$$(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}|\mathbf{z}) = \alpha(\mathbf{x}|\mathbf{z}) + \beta(\mathbf{y}|\mathbf{z})$$

和

$$(\mathbf{x}|\alpha\mathbf{y} + \beta\mathbf{z}) = \bar{\alpha}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) + \bar{\beta}(\mathbf{x}|\mathbf{z});$$

2. $\overline{(\mathbf{x}|\mathbf{y})} = (\mathbf{y}|\mathbf{x})$;
3. $(\mathbf{x}|\mathbf{x})$ 是非负实数且 $(\mathbf{x}|\mathbf{x}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$. 定义

$$G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) = ((\mathbf{v}_i|\mathbf{v}_j))_{m \times m}.$$

称之为 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 的 *Gram* 矩阵. 矩阵 $G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ 是 Hermitian 的.

命题 10.6 设 V 是欧式空间, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$. 则 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 线性相关当且仅当

$$\text{rank}(G(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)) < m.$$

例 10.7 在 \mathbb{C}^n 中, 对任意 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^t$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^t$, 定义

$$(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \mathbf{x}^t \bar{\mathbf{y}} = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_n \bar{y}_n.$$

则 \mathbb{C}^n 是 *Hermitian* 空间.

引理 10.8 设 $P \in GL_n(\mathbb{C})$. 则 P^*P 是正定矩阵.

证明. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. 可直接验证,

$$(A^*)^* = A, \quad (AB)^* = B^*A^*.$$

于是, P^*P 是 Hermitian 的.

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$. 因为 $P \in GL_n(\mathbb{C})$, 所以 $\mathbf{y} := P\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

故

$$\bar{\mathbf{y}}^t \mathbf{y} > 0 \implies \bar{\mathbf{x}}^t P^* P \mathbf{x} > 0. \quad \square.$$

引理 10.9 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. 则 $\text{rank}(A^*A) = \text{rank}(A)$;

证明. (i) 设 V_A 是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间, U 是以 A^*A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间. 则 $V_A \subset U$. 反之, 设 $\mathbf{z} \in U$. 则 $A^*A\mathbf{z} = \mathbf{0}$. 则 $\bar{\mathbf{z}}A^*A\mathbf{z} = 0$. 令 $\mathbf{y} = A\mathbf{z}$. 则 $\bar{\mathbf{y}}^t \mathbf{y} = \bar{\mathbf{z}}A^*A\mathbf{z} = 0$. 我们得到

$$\bar{\mathbf{y}}^t \mathbf{y} = |\mathbf{y}|^2 = 0.$$

由此可知 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$. 故 $U \subset V_A$. 我们有 $V_A = U$. 根据对偶定理 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^*A)$. \square

例 10.10 对任意 $A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 定义:

$$(A|B) = \text{tr}(AB^*) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{i,j} \bar{b}_{i,j}.$$

则对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$(A|\alpha B) = \text{tr}(A(\alpha B)^*) = \text{tr}(A\bar{\alpha}B^*) = \bar{\alpha}\text{tr}(AB^*) = \bar{\alpha}(A|B).$$

故 $(|)$ 是半双线性的

$$(B|A) = \text{tr}(BA^*) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{i,j} \bar{a}_{i,j} = \overline{(A|B)}.$$

故 $(|)$ 是 *Hermitian* 的.

$$(A|A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2.$$

故 $(|)$ 正定. 由此得出, $(\mathbb{C}^{m \times n}, (|))$ 是 *Hermitian* 空间.

10.3 长度、距离和正交

设 V 是 *Hermitian* 空间.

定义 10.11 设 $\mathbf{x} \in V$. 称 $\sqrt{(\mathbf{x}|\mathbf{x})}$ 是 \mathbf{x} 的长度, 记为 $\|\mathbf{x}\|$. 再设 $\mathbf{y} \in V$. 则 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 称为 \mathbf{x} 到 \mathbf{y} 之间的距离.

定理 10.12 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$. 则 $|(\mathbf{x}|\mathbf{y})| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ (*Cauchy-Bunyakovski* 不等式). 特别地, $|(\mathbf{x}|\mathbf{y})| = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ 当且仅当 \mathbf{x}, \mathbf{y} 线性相关.

设 $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$. 如果 $\|\mathbf{x}\| = 1$, 则称 \mathbf{x} 是单位向量.

定义 10.13 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$. 如果 $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = 0$, 则称 \mathbf{x} 和 \mathbf{y} 正交, 记为 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$.

零向量与任何向量都正交.

引理 10.14 设 $\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in V$, 其中 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 非零.

(i) $\mathbf{x} \perp \mathbf{x} \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(ii) 如果 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 两两正交, 则它们线性无关.

10.4 单位正交基

设 $\dim(V) = n$, $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 中两两正交的单位向量. 根据引理 10.14, $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基. 称为 V 的一组单位正交基.

定理 10.15 (*Gram-Schmidt 正交化*) 设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ 线性无关. 则存在两两正交的单位向量 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_k$ 使得

$$\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \epsilon_1, \dots, \epsilon_i \rangle,$$

$i = 1, 2, \dots, k$. 特别地, V 有单位正交基.

10.5 正交补

定义 10.16 设 $U_1, U_2 \subset V$ 是子空间. 如果对于任意的 $\mathbf{u}_1 \in U_1$ 和 $\mathbf{u}_2 \in U_2$ 我们有 $\mathbf{u}_1 \perp \mathbf{u}_2$, 则称子空间 U_1 和 U_2 正交, 记为 $U_1 \perp U_2$.

定理 10.17 设 $U \subset V$ 是子空间. 定义

$$U^\perp = \{\mathbf{x} \in V \mid \forall \mathbf{u} \in U, \mathbf{u} \perp \mathbf{x}\}.$$

则

(i) U^\perp 是子空间且 $U \perp U^\perp$;

(ii) $V = U \oplus U^\perp$ (称 U^\perp 是 U 的正交补).

(iii) $(U^\perp)^\perp = U$.

推论 10.18 设 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d$ 是 V 中的单位正交向量. 则 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d$ 可扩充为 V 的一组单位正交基.

注解 10.19 设 V 是 Hermitian 空间, $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组单位正交基. 令

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + x_n \mathbf{e}_n \quad \text{和} \quad \mathbf{y} = y_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + y_n \mathbf{e}_n.$$

则

$$(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = x_1 \bar{y}_1 + \cdots + x_n \bar{y}_n.$$

11 U -矩阵与 U -等价

记号: 在本节中 V 是 n 维 Hermitian 空间, 其中 $n > 0$.

设 V 有两组单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$, 矩阵 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ 满足

$$(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P.$$

则对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 我们有

$$\delta_{i,j} = (\epsilon_i | \epsilon_j) = ((\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \vec{P}^{(i)} | (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \vec{P}^{(j)}) = (\vec{P}^{(i)})^t \overline{\vec{P}^{(j)}}.$$

由此得出 $P^t \bar{P} = E$, 进而 $P^* P = E$.

定义 11.1 设 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. 如果 $P^* = P^{-1}$, 则称 P 是 U -矩阵. 所有 n 阶 U -矩阵的集合记为 $U_n(\mathbb{C})$.

命题 11.2 集合 $U_n(\mathbb{C})$ 是 $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ 的子群.

例 11.3 设 $M = A + B\sqrt{-1}$, 其中 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. 则 M 是 U -矩阵当且仅当 $A^t B$ 对称且 $A^t A + B^t B = E$.

证明. 直接计算得

$$M^* M = (A^t - B^t \sqrt{-1})(A + B\sqrt{-1}) = (A^t A + B^t B) + (A^t B - B^t A)\sqrt{-1}.$$

故 $M^* M = E$ 当且仅当 $A^t A + B^t B = E$ 和 $A^t B = B^t A$. \square

命题 11.4 设 *Hermitian* 空间 V 有基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 和 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$, 矩阵 $P \in GL_n(\mathbb{C})$ 满足

$$(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P.$$

再设 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是单位正交基. 则 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ 是单位正交基当且仅当 $P \in U_n(\mathbb{C})$.

定义 11.5 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. 如果存在 $P \in U_n(\mathbb{C})$ 使得 $B = P^{-1}AP$, 则称 A 与 B 是 U -等价(U -相似)的, 记为 $A \sim_u B$.

问题. 给定 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 求它在 U 等价下的标准型. 给定 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 判定它们是否 U -等价.

12 正规算子与正规矩阵

记号: 在本节中 V 是 n 维 *Hermitian* 空间, 其中 $n > 0$.

定义 12.1 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 如果算子 $\mathcal{B} \in \mathcal{L}(V)$ 满足对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$,

$$(\mathcal{A}(\mathbf{x})|\mathbf{y}) = (\mathbf{x}|\mathcal{B}(\mathbf{y})),$$

则称 \mathcal{B} 是 \mathcal{A} 的伴随算子.

命题 12.2 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 则 \mathcal{A} 的伴随算子存在且唯一. 如果 \mathcal{A} 在 V 的单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵等于 A , 则其伴随算子在该基下的矩阵等于 A^* .

我们把 \mathcal{A} 的伴随算子记为 \mathcal{A}^* .

定义 12.3 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 如果 $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$, 则称 \mathcal{A} 是正规算子. 类似地, 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 如果 $AA^* = A^*A$, 则称 A 是正规矩阵.

命题 12.4 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, \mathcal{A} 在 $\mathcal{L}(V)$ 的单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 A . 则 \mathcal{A} 正规当且仅当 A 正规.

定义 12.5 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 如果 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, 则称 \mathcal{A} 是 Hermitian 算子. 如果 $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$, 则称 \mathcal{A} 是斜 Hermitian 算子.

Hermitian 和斜 Hermitian 算子都是正规算子. 显然, Hermitian 和斜 Hermitian 矩阵 ($A^* = -A$) 都是正规矩阵.

命题 12.6 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, \mathcal{A} 在 $\mathcal{L}(V)$ 的单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 A . 则 \mathcal{A} (斜) Hermitian 算子当且仅当 A (斜) Hermitian 矩阵.

定义 12.7 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 如果对于任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$,

$$(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = (\mathcal{A}(\mathbf{x})|\mathcal{A}(\mathbf{y})),$$

则称 \mathcal{A} 是保内(积)的.

命题 12.8 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, \mathcal{A} 在 $\mathcal{L}(V)$ 的单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵为 A . 则下列断言等价

(i) \mathcal{A} 保内;

(ii) $A \in U_n(\mathbb{C})$;

(iii) 对任意 $\mathbf{x} \in V$, $\|\mathbf{x}\| = \|\mathcal{A}(\mathbf{x})\|$ (保长);

(iv) 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|\mathcal{A}(\mathbf{x}) - \mathcal{A}(\mathbf{y})\|$ (保距).

注解 12.9 保内算子也称为 U -算子.

13 正规矩阵的标准型

引理 13.1 设

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ O_{(n-k) \times k} & D \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}), \quad \text{其中 } B \in M_k(\mathbb{C}).$$

如果 A 正规, 则 $C = O_{k \times (n-k)}$.

引理 13.2 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 是正规算子, $W \subset V$ 是 \mathcal{A} -子空间. 则

(i) W^\perp 也是 \mathcal{A} -子空间;

(ii) \mathcal{A}_W 也是正规算子.

引理 13.3 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 则 \mathcal{A} 有一维 \mathcal{A} -不变子空间.

定理 13.4 设 $\mathcal{A} \in V$ 正规. 则存在 V 的一组单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 使得 \mathcal{A} 在该基下是对角阵.

推论 13.5 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 正规. 则存在 A 与某个对角矩阵 U -相似.

定理 13.6 (i) 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ Hermitian. 则 \mathcal{A} 在 V 的某组单位正交基下的矩阵是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 不必两两不同.

(ii) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ Hermitian. 则 $A \sim_u \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ 不必两两不同.

(iii) 特别地, Hermitian 矩阵和 Hermitian 算子的特征根都是实数.

证明. 这里只证明 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. 因为 A Hermitian 且 $A \sim_u \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 所以 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 也是 Hermitian 的. 由此可知,

$$\begin{aligned} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^* &= \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \\ \Rightarrow \bar{\lambda}_1 &= \lambda_1, \dots, \bar{\lambda}_n = \lambda_n \\ \Rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n &\in \mathbb{R}. \quad \square \end{aligned}$$

定理 13.7 (i) 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 斜 *Hermitian*. 则 \mathcal{A} 在 V 的某组单位正交基下的矩阵是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是零或纯虚数不必两两不同.

(ii) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 斜 *Hermitian*. 则 $A \sim_u \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是零或纯虚数不必两两不同.

(iii) 特别地, 斜 *Hermitian* 矩阵和斜 *Hermitian* 算子的特征根都是零或纯虚数.

证明. 这里只证明 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是零或者纯虚数. 因为 A 是斜 *Hermitian* 且 $A \sim_u \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 所以 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 也是斜 *Hermitian* 的. 由此可知,

$$\begin{aligned} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^* &= -\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \\ &\Rightarrow \bar{\lambda}_1 = -\lambda_1, \dots, \bar{\lambda}_n = -\lambda_n \\ &\Rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \{y\sqrt{-1} \mid y \in \mathbb{R}\}. \quad \square \end{aligned}$$

定理 13.8 (i) 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 是 U -算子. 则 \mathcal{A} 在 V 的某组单位正交基下的矩阵是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的复数模长等于 1.

(ii) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 斜 *Hermitian*. 则 $A \sim_u \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的复数模长等于 1.

(iii) 特别地, U -矩阵和 U -算子的特征根的复数模长都等于 1.

证明. 这里只证明 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的模长等于 1. 因为 A 是 U 矩阵且 $A \sim_u \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 所以 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 也是 U 矩阵. 由此可知,

$$\begin{aligned} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^* &= \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}) \\ &\Rightarrow \bar{\lambda}_1 = \lambda_1^{-1}, \dots, \bar{\lambda}_n = \lambda_n^{-1} \\ &\Rightarrow |\lambda_1| = \dots = |\lambda_n| = 1. \quad \square \end{aligned}$$

14 正定算子

定义 14.1 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 是 *Hermitian* 算子. 如果对于任意 $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$, $(\mathcal{A}(\mathbf{x})|\mathbf{x}) > 0$. 则称 \mathcal{A} 是正定算子.

命题 14.2 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 则 \mathcal{A} 正定当且仅当它在 V 的单位正交基下的矩阵正定.

命题 14.3 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 则 \mathcal{A} 正定当且仅当它的特征根都是正实数.

证明. 因为 \mathcal{A} 是 *Hermitian* 的, 所以存在 V 的一组单位正交基 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 使得 \mathcal{A} 在该基下的矩阵是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 且 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. 特别地, $\mathcal{A}(\mathbf{e}_i) = \lambda_i \mathbf{e}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.

如果 \mathcal{A} 是正定的, 则

$$(\mathcal{A}(\mathbf{e}_i)|\mathbf{e}_i) > 0 \implies (\lambda_i \mathbf{e}_i|\mathbf{e}_i) > 0 \implies \lambda_i > 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

反之, 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}^+$, $\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + \dots + x_n \mathbf{e}_n \neq \mathbf{0}$. 则

$$(\mathcal{A}(\mathbf{x})|\mathbf{x}) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mathbf{e}_i \mid \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \bar{x}_i > 0.$$

故 \mathcal{A} 是正定算子. \square

定理 14.4 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 是半正定算子. 则存在唯一的半正定算子 \mathcal{B} 使得 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$ 且 $\mathcal{B} \in \mathbb{C}[\mathcal{A}]$.

推论 14.5 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 半正定. 则存在唯一的半正定矩阵 $B \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $A = B^2$ 且 $B \in \mathbb{C}[A]$.

定理 14.6 设 $A \in GL_n(\mathbb{C})$ 可逆. 则存在唯一的正定矩阵 S 和 U -矩阵 T 使得 $A = ST$.

推论 14.7 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 可逆. 则存在唯一的正定算子 \mathcal{S} 和 U -算子 \mathcal{T} 使得 $\mathcal{A} = \mathcal{S}\mathcal{T}$.