

第一章 预备知识

5.6 序关系

定义 5.21 设 \preceq 是集合 S 上的二元关系. 如果

(i) 对任意 $x \in S$, $x \preceq x$ (自反性),

(ii) 如果 $x, y \in S$ 且 $x \preceq y$ 和 $y \preceq x$, 则 $y = x$ (反对称性),

(iii) 如果 $x, y, z \in S$, $x \preceq y$ 且 $y \preceq z$, 则 $x \preceq z$ (传递性),

则称 \preceq 是偏序. 进而, 设 \preceq 是 S 上的偏序. 如果对任意 $x, y \in S$, 我们有 $x \preceq y$ 或 $y \preceq x$. 则称 \preceq 是全序.

例 5.22 在实数集上, \leq 和 \geq 都是全序. 设 S 是非空集合, T 是 S 中所有子集的集合. 则 \subset 和 \supset 是 T 上的偏序关系.

定义 5.23 设 \preceq 是集合 S 上的偏序关系, $z \in S$. 如果不存在 $x \in S \setminus \{z\}$ 使得 $z \preceq x$, 则称 z 是 S 中关于 \preceq 的极大元. 如果对于任意 $x \in S$, 我们都有 $x \preceq z$. 则称 z 是 S 中关于 \preceq 的最大元. 类似地, 我们可以定义关于偏序的极小元和最小元.

注解 5.24 极小元意味着集合 S 中没有其它元素比它更小. 最小元意味着集合 S 中的其它元素都比它大. 对极大元和最大原有类似的直观描述.

注解 5.25 设 \preceq 是集合 S 上的偏序关系, z_1 和 z_2 是关于 \preceq 的两个最大元. 则 $z_1 \preceq z_2$ 和 $z_2 \preceq z_1$. 根据反对称性 $z_1 = z_2$. 故当最大元存在时, 它是唯一的. 此时它也是唯一的极大元. 类似的结论也适用于最小元和极小元.

例 5.26 设 $S = \{1, 2, 3\}$, T 是 S 的所有真子集组成的集合. 则 \subset 是 T 上的偏序. 关于该偏序的极大元是 $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}$, 没有最大元. 关于该偏序的最小元是 \emptyset , 也是唯一的极小元. \square

6 置换

6.1 置换的定义和乘法

设 T 是含有 n 个元素的集合. 我们不妨设

$$T = \{1, 2, \dots, n\}.$$

令 S_n 是从 T 到 T 的所有双射的集合. 则 $\text{card}(S_n) = n!$.

设 $\sigma \in S_n$ 使得 $\sigma(k) = i_k, k = 1, 2, \dots, n$. 我们可以把 σ 表示为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

其中 $i_1, i_2, \dots, i_n \in T$, 两两不同. 我们称 σ 是一个关于

$1, 2, \dots, n$ 的置换. 设 e 是 T 上的恒同映射, 即

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix},$$

因为双射的复合仍是双射, 所以, 对任意 $\sigma, \tau \in S_n$, $\sigma \circ \tau \in S_n$. 我们把 $\sigma \circ \tau$ 简记为 $\sigma\tau$, 并简称为 σ 和 τ 的积. 由映射复合的性质可知, 对任意 $\sigma, \tau, \delta \in S_n$,

$$(\sigma\tau)\delta = \sigma(\tau\delta) \quad \text{和} \quad e\sigma = \sigma e = \sigma.$$

又因为 σ 是双射, 所以 $\sigma^{-1} \in S_n$ 且

$$\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = e.$$

例 6.1 设在 S_4 中

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 $\sigma\tau$ 和 $\tau\sigma$,

解. 根据映射复合的定义可知:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

和

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

注解 6.2 在上例中, $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. 故 S_n 中的乘法不满足交换律. 特别地,

$$(\sigma\tau)^2 = \sigma\tau\sigma\tau$$

一般不等于 $\sigma^2\tau^2$.

设 $k \in \mathbb{Z}$, $\sigma \in S_n$. 如果 $k > 0$, 则

$$\sigma^k := \underbrace{\sigma \circ \cdots \circ \sigma}_k.$$

当 $k = 0$ 时, $\sigma^k := e$. 当 $k < 0$,

$$\sigma^k := \underbrace{\sigma^{-1} \circ \cdots \circ \sigma^{-1}}_{-k}.$$

可直接验证, 对任意 $i, j \in \mathbb{Z}$,

$$\sigma^i \sigma^j = \sigma^{i+j}, \quad \sigma^{ij} = (\sigma^i)^j = (\sigma^j)^i.$$

根据穿衣脱衣规则, 对任意 $\tau \in S_n$,

$$(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}.$$

引理 6.3 设 $\sigma \in S_n$. 则存在 $k \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $\sigma^k = e$.

证明. 考虑无穷序列: σ, σ^2, \dots . 则存在 $i, j \in \mathbb{Z}^+$ 且 $i < j$ 使得 $\sigma^j = \sigma^i$. 于是, $\sigma^{j-i} = e$. \square

定义 6.4 设 $\sigma \in S_n$. 使得 $\sigma^k = e$ 的最小正整数称为 σ 的阶, 记为 $\text{ord}(\sigma)$.

例 6.5 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in S_4.$$

求 $\text{ord}(\sigma)$.

解. 直接计算得

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

进而,

$$\sigma^3 = \sigma\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = e.$$

于是, $\text{ord}(\sigma) = 3$.

命题 6.6 设 $\sigma \in S_n$ 且 $k = \text{ord}(\sigma)$. 则对任意 $m \in \mathbb{Z}$,
 $\sigma^m = e \iff k|m$.

证明. 设 $q = \text{quo}(m, k), r = \text{rem}(m, k)$. 则

$$\sigma^m = \sigma^{qk+r} = (\sigma^k)^q \sigma^r = \sigma^r.$$

于是, $\sigma^m = e \iff \sigma^r = e$. 因为 $0 \leq r < k$, 所以

$$\sigma^m = e \iff r = 0. \quad \square$$

6.2 循环分解

定义 6.7 设 $\sigma \in S_n$. 如果存在 $i_1, i_2, \dots, i_k \in T$ 两两不同使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

且对任意 $m \in T \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$,

$$\sigma(m) = m,$$

则称 σ 是一个长度为 k 的循环. 我们把这样的循环记为 $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

注意到

$$(i_1 i_2, \dots, i_k) = (i_2 i_3 \dots i_k i_1) = (i_3 i_4 \dots i_k i_1 i_2) = \dots$$

此外, 长度为 1 的循环只有 e .

例 6.8 可直接验证循环 $(i_1 i_2 \dots i_k)^{-1} = (i_k i_{k-1} \dots i_2 i_1)$.

引理 6.9 设 $\sigma \in S_n$ 是长度为 k 的循环. 则 $\text{ord}(\sigma) = k$.

证明. 设 $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ 且 $m \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, 则

$$\sigma^m(i_1) = i_{1+m}.$$

故 $\sigma^m \neq e$. 而 $\sigma^k(i_1) = i_1$. 注意到对任意 $\ell \in \{2, \dots, k\}$,

$$\sigma = (i_\ell i_{\ell+1} \dots i_k \dots i_1 \dots i_{\ell-1}).$$

故 $\sigma^k(i_\ell) = i_\ell$. 于是, $\sigma^k = e$. 我们得到 $\text{ord}(\sigma) = k$. \square

恒同映射也称为长度等于 1 的循环, 它是平凡的.

例 6.10 把

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 3 & 2 & 4 & 5 & 7 & 6 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

写成互不相交的循环之积.

解. $\sigma = (198)(23)(67)$.

设 $\sigma \in S_n$. 定义 $M_\sigma = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \sigma(i) \neq i\}$.

例 6.11 我们有 $M_e = \emptyset$ 和 $M_{(i_1, \dots, i_k)} = \{i_1, \dots, i_k\}$.

引理 6.12 设 $\sigma \in S_n$ 且 $i \in M_\sigma$. 则 $\sigma(i) \in M_\sigma$.

证明. 假设 $\sigma(i) \notin M_\sigma$. 则 $\sigma^2(i) = \sigma(i)$. 两边同时作用 σ^{-1} 得 $\sigma(i) = i$, 矛盾. \square

引理 6.13 设 $\sigma, \tau \in S_n$ 互不相交. 则 $\sigma\tau = \tau\sigma$.

证明. 如果 $\sigma = e$ 或 $\tau = e$, 则结论显然成立.

设 $\sigma \neq e$ 和 $\tau \neq e$. 令 $i \in M_\sigma$. 则 $i \notin M_\tau$. 故 $\tau(i) = i$. 从而, $\sigma\tau(i) = \sigma(i)$. 另一方面, 引理 6.12 蕴含 $\sigma(i) \in M_\sigma$. 故 $\sigma(i) \notin M_\tau$. 我们有 $\tau\sigma(i) = \sigma(i)$. 于是, 对任意 $i \in M_\sigma$,

$$\sigma\tau(i) = \tau\sigma(i).$$

类似地, 对任意 $j \in M_\tau$, $\sigma\tau(j) = \tau\sigma(j)$.

而对任意 $k \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus (M_\sigma \cup M_\tau)$,

$$\sigma\tau(k) = k = \tau\sigma(k)$$

显然成立. 综上所述, $\sigma\tau = \tau\sigma$. \square

定义 6.14 设 $\sigma, \tau \in S_n$. 如果 $M_\sigma \cap M_\tau = \emptyset$, 则称 σ 和 τ 是两个互不相交的置换.

命题 6.15 设 $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$. 则 σ 是有限个两两互不相交的长度大于 1 的循环之积.

证明. 我们对 $\text{card}(M_\sigma)$ 归纳.

根据引理 6.12, $\text{card}(M_\sigma) > 1$. 如果 $\text{card}(M_\sigma) = 2$, 则设 $M_\sigma = \{i_1, i_2\}$. 再利用引理 6.12 可知 $\sigma = (i_1 i_2)$. 设对 $2 \leq \text{card}(M_\sigma) < m$ 结论都成立. 考虑 $\text{card}(M_\sigma) = m$ 的情形. 设 $i_1 \in M_\sigma$ 且 $p = \text{ord}(\sigma)$. 则 $\sigma^p(i_1) = i_1$. 于是, 存在最小正整数 k 使得 $\sigma^k(i_1) = i_1$. 则

$$i_1, i_2 := \sigma(i_1), \dots, i_k := \sigma^{k-1}(i_1) \quad (1)$$

两两不同. 否则, 存在 $r, s \in \{0, 1, \dots, k-1\}$ 使得 $r < s$ 且 $\sigma^s(i_1) = \sigma^r(i_1)$. 则 $\sigma^{s-r}(i_1) = i_1$. 但 $0 < s-r < k$, 矛盾. 由 (1) 和 $\sigma(i_k) = \sigma^k(i_1) = i_1$ 可知, 循环 $\tau = (i_1 i_2 \dots i_k)$ 满足

$\tau(i_1) = \sigma(i_1), \dots, \tau(i_{k-1}) = \sigma(i_{k-1}), \tau(i_k) = i_1 = \sigma(i_k)$. 换言之,

$$\tau^{-1}\sigma(i_1) = i_1, \dots, \tau^{-1}\sigma(i_{k-1}) = i_{k-1}, \tau^{-1}\sigma(i_k) = i_k.$$

令 $\lambda = \tau^{-1}\sigma$. 则 $i_1, \dots, i_k \notin M_\lambda$. 设 $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus M_\sigma$. 则 $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$. 故 $\lambda(j) = \tau^{-1}\sigma(j) = \tau^{-1}(j) = j$. 于是,

$$M_\lambda \subset M_\sigma \setminus \{i_1, \dots, i_k\} \implies \text{card}(M_\lambda) < m.$$

如果 $M_\lambda = \emptyset$, 则 $\lambda = e$. 故 $\sigma = \tau$ 是循环. 否则, 归纳假设蕴含 $\lambda = \lambda_1 \cdots \lambda_s$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是两两互不相交的循环. 又因为 $i_1, \dots, i_k \notin M_\lambda$, 所以每个循环 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 与 τ 都不相交. 从而 $\sigma = \tau\lambda = \tau\lambda_1 \cdots \lambda_s$ 即为所求. \square

下面来证明上述定理中循环分解的唯一性.

定理 6.16 设 $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$. 则在不计循环出现顺序的前提下, σ 可以唯一地写成有限个两两互不相交的(长度大于 1 的)循环之积.

证明. 分解的存在性见命题 6.15. 下面证明唯一性. 设

$$\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p = \lambda_1 \cdots \lambda_q,$$

其中 τ_1, \dots, τ_p 是一组两两互不相交的循环, $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ 是另一组互不相交的循环. 我们要证明 $p = q$ 且适当调整下标后, $\tau_1 = \lambda_1, \dots, \tau_p = \lambda_p$.

我们对 p 归纳. 设 $\tau_1 = (i_1 i_2 \dots i_k)$. 则 $i_1 \in M_\sigma$, 故 i_1 会被唯一的一个第二组的循环移动. 由引理 6.13 可知, 不妨设 λ_1 移动 i_1 . 则

$$\sigma(i_1) = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_p(i_1) = \tau_1(i_1) = i_2$$

且

$$\sigma(i_1) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_p(i_1) = \lambda_1(i_1).$$

故 $\lambda_1(i_1) = i_2$. 特别地, i_2 在循环 λ_1 中出现且不在其它循环中出现. 利用上述推理方式可得 $\lambda_1(i_2) = i_3$. 进而

$$\lambda_1(i_j) = i_{j+1}, \quad j \in \{3, \dots, k-1\} \quad \text{且} \quad \lambda_1(i_k) = i_1.$$

于是, $\lambda_1 = \tau_1$. 特别地, 当 $p = 1$ 时, $\sigma = \tau_1 = \lambda_1$.

设 $p > 1$ 且结论对 $p-1$ 成立. 则根据 $\tau_1 = \lambda_1$, 我们有 $\tau_2 \cdots \tau_p = \lambda_2 \cdots \lambda_q$. 由归纳假设可知, $p = q$ 且在适当调整下标后, $\tau_2 = \lambda_2, \dots, \tau_p = \lambda_p$. \square

推论 6.17 设 $\sigma \in S_n \setminus \{e\}$ 是互不相交的循环 τ_1, \dots, τ_m 之积. 则 $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(\text{ord}(\tau_1), \dots, \text{ord}(\tau_m))$.

证明. 设 $\ell_i = \text{ord}(\tau_i)$, $i = 1, \dots, m$, $\ell = \text{lcm}(\ell_1, \dots, \ell_m)$. 令

$$\ell = k_i \ell_i,$$

其中 $k_i \in \mathbb{Z}^+$, $i = 1, 2, \dots, m$. 第三讲引理 6.11 蕴含

$$\sigma^\ell = \tau_1^\ell \cdots \tau_m^\ell = \tau_1^{\ell_1 k_1} \cdots \tau_m^{\ell_m k_m} = e.$$

设 $k = \text{ord}(\sigma)$. 根据第三讲命题 6.6, $k|\ell$. 我们有

$$\sigma^k = \tau_1^k \cdots \tau_m^k = e.$$

不妨设 $\tau_1(1) \neq 1$. 因为 τ_1 与 τ_2, \dots, τ_m 都不相交, 所以 $\tau_2(1) = \cdots = \tau_m(1) = 1$. 于是, $\tau_1^k(1) = 1$. 故 $\tau_1^k = e$. 根据第三讲命题 6.6, 我们得到 $\ell_1|k$. 同理, $\ell_2|k, \dots, \ell_m|k$. 故 k 也是 ℓ_1, \dots, ℓ_m 的公倍数. 再根据 $k|\ell$ 可知, $k = \ell$. \square

例 6.18 计算 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 10 & 8 & 2 & 9 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ 的阶.

解. $\sigma = (134689)(25107) \implies \text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(6, 4) = 12$.

命题 6.19 设 $\sigma, (i_1, \dots, i_k) \in S_n$. 则

$$\sigma(i_1, \dots, i_k) = (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))\sigma.$$

证明. 设 $a \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$. 则

$$\sigma(i_1, \dots, i_k)(a) = \sigma(a) \quad \text{和} \quad (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))\sigma(a) = \sigma(a).$$

设 $j \in \{1, \dots, k-1\}$. 则

$$\sigma(i_1, \dots, i_k)(i_j) = \sigma(i_{j+1}) \quad \text{和} \quad (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))\sigma(i_j) = \sigma(i_{j+1}).$$

进而,

$$\sigma(i_1, \dots, i_k)(i_k) = \sigma(i_1) \quad \text{和} \quad (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))\sigma(i_k) = \sigma(i_1).$$

综上所述, $\sigma(i_1, \dots, i_k) = (\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k))\sigma$. \square

6.3 偶置换和奇置换

长度等于 2 的循环称为对换(transposition). 对换的逆就是其本身.

引理 6.20 任何一个置换都是若干个对换之积.

证明. 根据定理 6.16, 只要证明任何一个循环可以写成若干个对换之积即可. 我们验证:

$$(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_k i_{k-1}) \cdots (i_k i_2)(i_k i_1), \quad (2)$$

其中 $k > 2$. 令 $\sigma = (i_k i_{k-1}) \cdots (i_k i_2)(i_k i_1)$.

对于任意 $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$, (i_1, \dots, i_k) 和 σ 都把 j 映成 j . 设 $\ell \in \{1, 2, \dots, k-2\}$. 则

$$\begin{aligned} \sigma(i_\ell) &= \underbrace{(i_k i_{k-1}) \cdots (i_k i_{\ell+2})}_{\text{保持 } i_\ell \text{ 不变}} \underbrace{(i_k i_{\ell+1})(i_k i_\ell)}_{\text{将 } i_\ell \text{ 映成 } i_{\ell+1}}(i_\ell) \\ &= \underbrace{(i_k i_{k-1}) \cdots (i_k i_{\ell+2})}_{\text{保持 } i_{\ell+1} \text{ 不变}}(i_{\ell+1}) \\ &= i_{\ell+1}. \end{aligned}$$

而 $\sigma(i_{k-1}) = (i_k i_{k-1})(i_{k-1}) = i_k$. 从而, $(i_1, \dots, i_{k-1})(i_k) = \sigma(i_k)$. 等式 (2) 成立. \square

例 6.21 把

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

写成对换之积.

解. 由循环分解和上述引理可知:

$$\sigma = (124)(56) = (42)(41)(56).$$

引理 6.22 设 $\sigma, \tau \in S_n$ 两个对换, $\sigma = (st)$ 且 $\sigma \neq \tau$. 则 S_n 中存在两个对换 σ' 和 τ' 满足

$$\sigma'(s) = s, \tau'(s) \neq s \text{ 且 } \tau\sigma = \tau'\sigma'.$$

证明. 设 $\tau = (uv)$.

情形 1. 如果 $\{s, t\} \cap \{u, v\} = \emptyset$, 则令 $\tau' = \sigma$ 和 $\sigma' = \tau$. 由第三讲引理 6.11 可知, $\tau\sigma = \tau'\sigma'$.

情形 2. 设 $\tau = (su)$. 则 $u \neq t$. 令 $\tau' = \sigma$ 和 $\sigma' = (tu)$. 根据命题 6.19, $(su)(st) = (st)(tu)$. 取 $\sigma' = (tu)$ 和 $\tau' = (st)$ 即可.

情形 3. 设 $\tau = (tu)$. 则 $u \neq s$. 根据命题 6.19, $(tu)(st) = (su)(tu)$. 取 $\tau' = (su)$ 和 $\sigma' = \tau$ 即可. \square

引理 6.23 设 $\tau_1, \dots, \tau_k \in S_n$ 是对换. 如果 $\tau_1 \cdots \tau_k = e$, 则 k 是偶数.

证明. 我们先证明下列断言:

断言. 设 $k > 2$. 则 e 可以写成 $k - 2$ 个对换之积.

断言的证明. 如果 $\tau_{k-1} = \tau_k$, 则 $\tau_{k-1}\tau_k = e$. 我们有 $\tau_1 \cdots \tau_{k-2} = e$. 断言成立.

否则 $\tau_{k-1} \neq \tau_k$. 设 $s \in \{1, 2, \dots, n\}$ 满足 $\tau_k(s) \neq s$. 根据引理 6.22, 存在对换 $\tau'_{k-1}, \tau'_k \in S_n$ 满足 $\tau'_k(s) = s$, $\tau'_{k-1}(s) \neq s$ 且 $\tau'_{k-1}\tau'_k = \tau_{k-1}\tau_k$. 于是 $e = \tau_1 \cdots \tau_{k-2}\tau'_{k-1}\tau'_k$. 特别地, 最右侧的对换不移动 s .

下面考虑 τ_{k-2}, τ'_{k-1} . 如果 $\tau_{k-2}\tau'_{k-1} = e$, 则 e 是 $k-2$ 个对换之积. 否则, 引理 6.22 蕴含存在对换 τ^*_{k-2} 和 τ^*_{k-1} 满足 $\tau^*_{k-1}(s) = s$, $\tau^*_{k-2}(s) \neq s$ 和 $\tau_{k-2}\tau'_{k-1} = \tau^*_{k-2}\tau^*_{k-1}$. 于是

$$e = \tau_1 \cdots \tau^*_{k-2}\tau^*_{k-1}\tau'_k.$$

特别地, 最右侧的两个对换都不移动 s , 但 τ^*_{k-2} 移动 s .

以此类推, 我们要么证明 e 是 $k-2$ 个对换之积; 要么得出 $e = \lambda_1\lambda_2 \cdots \lambda_k$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in S_n$ 是对换, 满足

$$\lambda_1(s) \neq s, \text{ 且 } \lambda_2(s) = \cdots = \lambda_k(s) = s.$$

但这意味着 $e(s) \neq s$. 矛盾. 断言成立.

反复利用断言可知, k 是偶数. \square

定理 6.24 设 $\sigma \in S_n$. 设 $\sigma = \lambda_1 \cdots \lambda_k = \mu_1 \cdots \mu_m$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_k, \mu_1, \dots, \mu_m$ 都是对换. 则 k 和 m 的奇偶性相同.

证明. 由穿衣脱衣规则可知, $e = \lambda_1 \cdots \lambda_k \mu_m^{-1} \cdots \mu_1^{-1}$. 因为对换的逆是其本身, 所以引理 6.23 蕴含 $k+m$ 是偶数. 于是, k 和 m 的奇偶性相同. \square

定义 6.25 设 $\sigma \in S_n$. 如果 σ 可以写成奇数个对换之积, 则称 σ 是奇置换. 否则称为偶置换. 特别地, e 是偶置换. 奇置换的符号定义为 -1 , 偶置换的符号为 1 . 置换 σ 的符号记为 ε_σ .

上述定理说明置换的符号是良定义的.

引理 6.26 设 $\sigma, \tau \in S_n$. 则 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau$.

证明. 注意到两个同号置换之积是偶置换, 而两个异号置换之积是奇置换. \square

注解 6.27 反复应用上述定理可知, 对 $\sigma_1, \dots, \sigma_k \in S_n$,

$$\varepsilon_{\sigma_1 \dots \sigma_k} = \varepsilon_{\sigma_1} \dots \varepsilon_{\sigma_k}.$$

记号. 所有 S_n 中偶置换的集合记为 A_n .

例 6.28 设 $\sigma \in S_n$ 和 $\tau \in A_n$. 则 $\sigma^{-1}\tau\sigma \in A_n$.

证明. 上述注解蕴含:

$$\varepsilon_{\sigma^{-1}\tau\sigma} = \varepsilon_{\sigma^{-1}} \varepsilon_\tau \varepsilon_\sigma = \varepsilon_{\sigma^{-1}} \varepsilon_\sigma = \varepsilon_{\sigma^{-1}\sigma} = \varepsilon_e = 1. \quad \square$$

推论 6.29 设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$, 其中 τ_1, \dots, τ_k 是两两互不相交的循环. 则 σ 的奇偶性与整数 $\sum_{i=1}^k (\text{ord}(\tau_i) - 1)$ 相同. 即 $\varepsilon_\sigma = (-1)^{\sum_{i=1}^k (\text{ord}(\tau_i) - 1)}$.

证明. 设 $\tau = (i_1 \dots i_m)$. 根据引理 6.20, $\tau = (i_m i_{m-1}) \cdots (i_m i_1)$. 于是, $\epsilon_\tau = (-1)^{m-1}$. 再根据第三讲引理 6.9 可知, $m = \text{ord}(\tau)$. 故 $\epsilon_\tau = (-1)^{\text{ord}(\tau)-1}$. 由上述引理和注解可知

$$\epsilon_\sigma = (-1)^{\sum_{i=1}^k (\text{ord}(\tau_i)-1)}. \quad \square$$

例 6.30 确定下列置换的阶数并判定其奇偶性:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 8 & 6 & 10 & 7 & 4 & 5 & 9 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

解. 计算得 $\pi = (136410)(289)(57)$. 于是

$$\text{ord}(\pi) = \text{lcm}(5, 3, 2) = 30.$$

进而 $\epsilon_\pi = (-1)^{4+2+1} = -1$. 故 π 是奇置换.

命题 6.31 令 A_n 是 S_n 中所有偶置换的集合. 证明: 当 $n > 1$ 时, $\text{card}(A_n) = n!/2$.

证明. 设 B_n 是 S_n 中所有奇置换的集合. 定义:

$$\begin{array}{ccc} \phi: A_n \longrightarrow B_n & \text{和} & \psi: B_n \longrightarrow A_n \\ \sigma \longmapsto (12)\sigma & & \tau \longmapsto (12)\tau \end{array}.$$

则

$$\psi \circ \phi(\sigma) = (12)(12)\sigma = \sigma \quad \text{且} \quad \phi \circ \psi(\tau) = (12)(12)\tau = \tau.$$

故 $\psi \circ \phi = \text{id}_{A_n}$ 且 $\phi \circ \psi = \text{id}_{B_n}$. 由第二讲命题 4.14 可知, ϕ 是双射. 故 $\text{card}(A_n) = \text{card}(B_n)$. 又因为 $S_n = A_n \cup B_n$ 且 $A_n \cap B_n = \emptyset$. 于是, $\text{card}(A_n) = n!/2$. \square