第二章　线性算子

引理 4.7 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, U_1, U_2 是非平凡 $\mathcal{A}$-子空间, 且 $V = U_1 \oplus U_2$. 设 $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}$ 是 U_1 的基, $\delta_1, \ldots, \delta_{d_2}$ 是 U_2 的基. 则在 V 的基底 $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}, \delta_1, \ldots, \delta_{d_2}$ 下 $\mathcal{A}$ 的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

其中 $A_i \in \mathrm{M}_{d_i}(F)$ 是 $\mathcal{A}_{U_i}$ 在对应基下的矩阵, $i = 1, 2$. 进而 $\mu_{\mathcal{A}} = \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}, \mu_{\mathcal{A}_{U_2}})$ *(取首一的最小公倍式)*.

证明. 注意到 $V = U_1 \oplus U_2$ 蕴含 $d_1 + d_2 = n(= \dim(V))$ 且 $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}, \delta_1, \ldots, \delta_{d_2}$ 线性无关. 所以 $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}, \delta_1, \ldots, \delta_{d_2}$ 是 V 的一组基. 对 $i \in \{1, 2, \ldots, d_1\}$, $\mathcal{A}(\epsilon_i) \in U_1$, $\mathcal{A}(\epsilon_i)$ 是 $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}$ 的线性组合, 它关于 $\delta_1, \ldots, \delta_{d_2}$ 的坐标都是零. 于是, 存在 $A_1 \in \mathrm{M}_{d_1}(F)$ 使得

$$(\mathcal{A}(\epsilon_1), \ldots, \mathcal{A}(\epsilon_{d_1})) = (\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}) A_1.$$

类似地, 存在 $A_2 \in \mathrm{M}_{d_1}(F)$ 使得

$$(\mathcal{A}(\delta_1), \ldots, \mathcal{A}(\delta_{d_1})) = (\delta_1, \ldots, \delta_{d_2}) A_2.$$

于是 A_i 是 $\mathcal{A}_{U_i}$ 在对应基底下的矩阵, $i = 1, 2$. 进而, $\mathcal{A}$ 在 V 的基底 $\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{d_1}, \delta_1, \ldots, \delta_{d_2}$ 下的矩阵等于 A.

设 $p = \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}, \mu_{\mathcal{A}_{U_2}})$. 由上一讲命题 4.3,

$$\mu_{\mathcal{A}_{U_1}} | \mu_{\mathcal{A}} \quad 和 \quad \mu_{\mathcal{A}_{U_2}} | \mu_{\mathcal{A}}.$$

于是 $p|\mu_{\mathcal{A}}$. 又因为 $\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}|p, \mu_{\mathcal{A}_{U_2}}|p$, 所以 $p(\mathcal{A}_{U_1}) = \mathcal{O}$ 和 $p(\mathcal{A}_{U_2}) = \mathcal{O}$. 于是

$$p(A) = \begin{pmatrix} p(A_1) & O \\ O & p(A_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

由此和上一讲引理 3.5, $\mu_{\mathcal{A}}|p$. 再由首一性可得 $p = \mu_{\mathcal{A}}$. □

例 4.8 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 μ_A.

解. 由上述引理

$$\mu_A = \mathrm{lcm}(\mu_{(1)}, \mu_{(0)}) = \mathrm{lcm}(t-1, t) = (t-1)t. \quad \square$$

例 4.9 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 满足 $\ker(\mathcal{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathcal{A}) = V$. 设 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_r$ 是 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 的一组基, $\mathbf{e}_{r+1}, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 $\ker(\mathcal{A})$ 的一组基. 则 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一组基. 因为 $\mathrm{im}(\mathcal{A})$ 和 $\ker(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$-子空间, 且 $\mathcal{A}(\mathbf{e}_j) = \mathbf{0}$, $j = r+1, r+2, \ldots, n$, 所以 $\mathcal{A}$ 在该基底下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 $B \in \mathrm{M}_r(F)$ 满秩. 当 $r = n$ 时, $B = A$. 否则, $\mu_A = \mathrm{lcm}(\mu_B, t)$.

定理 4.10 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, $U_1, \ldots, U_k$ 是非平凡 $\mathcal{A}$-子空间满足 $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$. 设 Z_i 是 U_i 的一组基, $i = 1, \ldots, k$. 则 $\mathcal{A}$ 在 V 的基底 $Z_1 \cup \cdots \cup Z_k$ 下的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O & \cdots & O \\ O & A_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & A_k \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 $\mathcal{A}_{U_i}$ 在 Z_i 下的矩阵, $i = 1, 2, \ldots, k$. 进而,

$$\mu_{\mathcal{A}} = \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}, \ldots, \mu_{\mathcal{A}_{U_k}}).$$

证明. 对 k 归纳. 当 $k = 1$ 时, 定理显然成立. 设 $k > 1$ 且 $k-1$ 时定理成立. 设 $W = U_1 \oplus \cdots \oplus U_{k-1}$. 则 $V = W \oplus U_k$, $Y = Z_1 \cup \cdots \cup Z_{k-1}$ 是 W 的基. 由引理 4.7, $\mathcal{A}$ 在基底 $W \cup Z_k$ 下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & A_k \end{pmatrix},$$

其中 B 是 $\mathcal{A}_W$ 在 Y 下的矩阵, A_k 是 $\mathcal{A}_{U_k}$ 在 Z_k 下的矩阵, 且 $\mu_{\mathcal{A}} = \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_W}, \mu_{A_{U_k}})$.

对 $\mathcal{A}_W, W, U_1, \ldots, U_{k-1}$ 用归纳假设得

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & O & \cdots & O \\ O & A_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & A_{k-1} \end{pmatrix},$$

其中 A_i 是 $\mathcal{A}_{U_i}$ 在 Z_i 下的矩阵, $i = 1, 2, \ldots, k-1$. 进而, $\mu_{\mathcal{A}_W} = \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}, \ldots, \mu_{\mathcal{A}_{U_{k-1}}})$. 于是, A 是所要求的形式. 注意到

$$\begin{aligned} &\mathrm{lcm}\left(\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}, \ldots, \mu_{\mathcal{A}_{U_k}}\right) \\ &= \mathrm{lcm}\left(\mathrm{lcm}\left(\mu_{\mathcal{A}_{U_1}}, \ldots, \mu_{\mathcal{A}_{U_{k-1}}}\right), \mu_{A_{U_k}}\right) \\ &= \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_W}, \mu_{A_{U_k}}) = \mu_{\mathcal{A}}. \quad \square \end{aligned}$$

5 不可分子空间

定义 5.1 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, U 是 $\mathcal{A}$-子空间. 如果 U 不能写成两个非零的 $\mathcal{A}$-子空间的直和, 则称 U 是 $\mathcal{A}$-不可分的.

命题 5.2 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 则 V 是有限个 $\mathcal{A}$-不可分子空间的直和.

证明. 设 $n = \dim(V)$. 我们对 n 归纳. 当 $n = 1$ 时, V 本身是 $\mathcal{A}$ 不可分的. 定理显然成立. 设 $n > 1$ 且 当空间维

数小于 n 时定理成立. 如果 V 是 $\mathcal{A}$ 不可分的, 则定理成立. 否则存在两个非零 $\mathcal{A}$-子空间 U, W 使得 $V = U \oplus W$. 则 $\dim(U)$ 和 $\dim(W)$ 的维数都小于 n. 由归纳假设, $U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$, 其中 U_i 是 A_U 不可分的, 从而也是 $\mathcal{A}$ 不可分的. 同样, $W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell$, 其中 W_j 是 $\mathcal{A}_W$ 不可分的, 从而也是 $\mathcal{A}$ 不可分的. 于是

$$V = U \oplus W = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k \oplus W_1 \oplus \cdots \oplus W_\ell. \quad \square$$

6 核核分解

定理 6.1 设 $\mathcal{A}\in\mathrm{Hom}(V,V)$, $f\in F[x]$ 且 $f(\mathcal{A})=\mathcal{O}$. 如果

$$f = pq$$

其中 $p, q \in F[x]$ 互素, 则

$$V = \ker(p(\mathcal{A})) \oplus \ker(q(\mathcal{A})).$$

证明. 见本学期第一讲定理 5.17. $\square$

例 6.2 设 $\mathcal{A}$ 是数乘算子. 则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) = t - \lambda$, 其中 $\lambda \in F$. 故 $V = \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})$. 故 $\mathcal{A} = \lambda\mathcal{E}$. 于是, $\mathcal{A}$ 在任何基底下的矩阵都是 λE.

例 6.3 设 $\mathcal{A}$ 是幂等算子, $\mathcal{A} \neq \mathcal{O}$, $\mathcal{A} \neq \mathcal{E}$. 则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) = t^2 - t = t(t-1)$. 故 $V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$. 设 $\ker(\mathcal{A})$ 的

一组基是 $\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_d$, $\ker(\mathcal{A}-\mathcal{E})$ 的一组基是 $\mathbf{e}_{d+1},\ldots,\mathbf{e}_n$. 则 $\mathcal{A}(\mathbf{e}_i)=\mathbf{0}$, $i=1,\ldots,d$, $\mathcal{A}(\mathbf{e}_j)=\mathbf{e}_j$, $j=d+1,\ldots,n$. 故 $\mathcal{A}$ 在 V 的基底下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} O & O \\ O & E_{n-d} \end{pmatrix}.$$

例 6.4 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V)$ 是幂零算子. 则 $\mu_{\mathcal{A}}(t)=t^k$, 其中 k 是某个正整数. 则 $V=\ker(\mathcal{A}^k)$. 不提供任何关于 $\mathcal{A}$ 的矩阵表示的信息.

定理 6.5 设 $\mathcal{A}\in\mathrm{Hom}(V,V)$, $f\in F[x]$ 且 $f(\mathcal{A})=\mathcal{O}$. 如果

$$f=p_1\cdots p_m,$$

其中 $p_1,\ldots p_m\in F[x]$ 两两互素, 则

$$V=K_1\oplus\cdots\oplus K_m,$$

其中 $K_i=\ker(p_i(\mathcal{A}))$, $i=1,\ldots,m$.

证明. 对 m 归纳. 当 $m=1$ 时结论是平凡的. 设 $m>1$ 且结论对 $m-1$ 成立. 令 $q=p_1\cdots p_{m-1}$. 因为 $\gcd(p_i,p_m)=1$, $i=1,\ldots,m$, 所以 $\gcd(q,p_m)=1$. 根据上述定理,

$$V=W\oplus K_m,\quad \text{其中 } W=\ker(q(\mathcal{A})). \tag{1}$$

设 $\mathcal{B}=\mathcal{A}|_W$. 对任意 $\mathbf{w}\in W$, $\mathcal{B}(\mathbf{w})=\mathcal{A}(\mathbf{w})$. 故

$$q(\mathcal{A})(\mathcal{B}(\mathbf{w}))=q(\mathcal{A})\mathcal{A}(\mathbf{w})=\mathcal{A}q(\mathcal{A})(\mathbf{w})=\mathcal{A}(\mathbf{0})=\mathbf{0}.$$

于是, $\mathcal{B}(\mathbf{w})\in W$. 即 $\mathcal{B}\in\mathrm{Hom}(W,W)$. 对任意 $\mathbf{w}\in W$,

$$q(\mathcal{B})(\mathbf{w})=q(\mathcal{A})(\mathbf{w})=\mathbf{0}.$$

由此可知, $q(\mathcal{B})=\mathcal{O}$. 根据归纳假设, 我们有

$$W=\ker(p_1(\mathcal{B}))\oplus\cdots\oplus\ker(p_{m-1}(\mathcal{B})). \tag{2}$$

下面验证:

$$\ker(p_i(\mathcal{B}))=K_i,\quad i=1,\ldots,m-1. \tag{3}$$

设 $\mathbf{w}\in\ker(p_i(\mathcal{B}))$. 则 $\mathbf{0}{=}p_i(\mathcal{B})(\mathbf{w}){=}p_i(\mathcal{A})(\mathbf{w})$. 故 $\mathbf{w}{\in}K_i$. 故 $\ker(p_i(\mathcal{B}))\subset K_i$. 设 $\mathbf{v}\in K_i$. 则 $q(\mathcal{A})(\mathbf{v})=\mathbf{0}$. 故 $\mathbf{v}\in W$. 由此得出, $\mathbf{0}=p_i(\mathcal{A})(\mathbf{v})=p_i(\mathcal{B})(\mathbf{v})$. 从而, $\mathbf{v}\in\ker(p_i(\mathcal{B}))$. 故 $K_i\subset\ker(p_i(\mathcal{B}))$. 等式 (3) 成立.

根据等式 (1), (2) 和 (3), 定理成立. □

定理 6.6 *(核核分解定理之极小多项式版) 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V)$, $\mu_{\mathcal{A}}=p_1^{m_1}\cdots p_s^{m_s}$, 其中 $p_1,\ldots,p_s\in F[t]\setminus F$, 不可约且两两互素, $m_1,\ldots,m_s\in\mathbb{Z}^+$. 令*

$$K_i=\ker(p_i^{m_i}(\mathcal{A})),\quad i=1,2,\ldots,s.$$

则

$$V = K_1 \oplus \cdots \oplus K_s,$$

且 $\mathcal{A}|_{K_i}$ 的极小多项式是 $p_i^{m_i}$, $i = 1, \ldots, s$.

证明. 上述定理蕴含 $V = K_1 \oplus \cdots \oplus K_s$.

设 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{K_i}$. 因为对任意 $\mathbf{v} \in K_i$, $p_i^{m_i}(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$. 所以 $\mathcal{A}_i$ 的极小多项式 μ_i 整除 $p_i^{m_i}$ (引理 3.2). 因为 p_i 不可约, 所以 $\mu_i = p_i^{k_i}$, 其中 $1 \le k_i \le m_i$. 由定理 4.10 可知,

$$\mu_{\mathcal{A}} = \operatorname{lcm}\left(p_1^{k_1}, \ldots, p_s^{k_s}\right).$$

因为 $p_1, \ldots, p_s$ 两两互素, 所以 $\mu_{\mathcal{A}} = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$. 由多项式不可约分解的唯一性得出 $k_i = m_i$, $i = 1, \ldots, s$.

定义 6.7 设 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(V), \mathbf{v}\in V, f(t)\in F[t]$. 如果 $f(\mathcal{A})(\mathbf{v})=\mathbf{0}$, 则称 $f(t)$ 是通过 $\mathcal{A}$ 零化 $\mathbf{v}$ 的多项式. 非零、次数最小的通过 $\mathcal{A}$ 零化 $\mathbf{v}$ 的多项式称为通过 $\mathcal{A}$ 零化 $\mathbf{v}$ 的极小多项式. 该极小多项式记为 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$, 它通常是首一的.

注意到 $\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}) = \mathcal{O}(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. 于是, $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$ 存在. 设 $f(\mathcal{A})(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. 由多项式带余除法可知

$$f(t) = q(t)\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(t) + r(t),$$

其中 $q, r \in F[t]$, $\deg(r) < \deg(\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}})$. 带入 $\mathcal{A}$ 得

$$\mathcal{O} = q(\mathcal{A})\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A}) + r(\mathcal{A}).$$

两侧同时作用在 $\mathbf{v}$ 上得到

$$\mathbf{0} = q(\mathcal{A})\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}) + r(\mathcal{A})(\mathbf{v}) = \mathbf{0} + r(\mathcal{A})(\mathbf{v}).$$

于是, $r(\mathcal{A})(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. 因为 $\deg(r) < \deg(\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}})$, 所以 $r(t) = 0$. 由此得出 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}|f$. 特别地, $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}|\mu_{\mathcal{A}}$.

命题 6.8 *(科斯特利金第二卷第56页习题 9)* 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$. 则 存在 $\mathbf{v} \in V$ 使得 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}} = \mu_{\mathcal{A}}$.

证明. 先设 $\mu_{\mathcal{A}} = p^k$, 其中 $p \in F[t]$ 不可约和首一. 因为 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}|\mu_A$ 且 p 不可约, 所以 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}} = p^{m_{\mathbf{v}}}$, 其中 $1 \le m_{\mathbf{v}} \le k$. 假设不存在 $\mathbf{v}$ 使得 $m_{\mathbf{v}} = k$. 则对任意 $\mathbf{v} \in V$, $m_{\mathbf{v}} \le k-1$. 于是 $p^{k-1} = q_{\mathbf{v}}\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$, 其中 $q_{\mathbf{v}} \in F[t]$. 我们有

$$\begin{aligned} p^{k-1}(\mathcal{A}) = \quad & q_{\mathbf{v}}(\mathcal{A})\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A}) \\ \Rightarrow \quad & p^{k-1}(\mathcal{A})(\mathbf{v}) = q_{\mathbf{v}}(\mathcal{A})\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}) \\ & \qquad = q_{\mathbf{v}}(\mathcal{A})\left(\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v})\right) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

由 $\mathbf{v}$ 的任意性得出 $p^{k-1}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$. 矛盾. 故当 $\mu_{\mathcal{A}} = p^k$ 时, 结论成立.

下面考虑一般情形. 设 $\mu_{\mathcal{A}} = p_1^{m_1} \cdots p_s^{m_s}$, 其中 $p_1, \ldots, p_s \in F[t] \setminus F$, 不可约且两两互素, $m_1, \ldots, m_s \in \mathbb{Z}^+$. 令

$$K_i = \ker(p_i^{m_i}(\mathcal{A})), \mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{k_i}, \mu_i = \mu_{\mathcal{A}_i}, \quad i = 1, 2, \ldots, s.$$

由定理 6.6,

$$V = K_1 \oplus \cdots \oplus K_s$$

且 $\mu_i = p_i^{m_i}$. 由上述证明可知存在 $\mathbf{v}_i \in K_i$ 使得 $\mu_{\mathcal{A}_i,\mathbf{v}_i} = \mu_i$, $i = 1, 2, \ldots, s$.

令 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_s$. 则,

$$\mathbf{0} = \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}) = \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}_1) + \cdots + \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}_s).$$

因为 $V = K_1 \oplus \cdots \oplus K_s$, 且每个 K_i 都是 $\mathcal{A}$ 不变的, 所以 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}_i) \in K_i$. 由直和的基本性质(见第一章第一讲定理 1.11 (ii)), $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(\mathcal{A})(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$. 于是, $\mu_{\mathcal{A}_i,\mathbf{v}_i} | \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$. 由此可知, $\mu_{\mathcal{A}_i} | \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$, $i = 1, 2, \ldots, s$. 从而 $\mu_{\mathcal{A}} = \mathrm{lcm}(\mu_{\mathcal{A}_1}, \ldots, \mu_{\mathcal{A}_s}) | \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$. 又因为 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}} | \mu_{\mathcal{A}}$. 我们有 $\mu_{\mathcal{A}} = \mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$. □

例 6.9 设 $\mathcal{A}$ 是数乘算子. 则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) = t - \lambda$, 其中 $\lambda \in F$. 设 $\mathbf{v} \in V$ 且 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. 则 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(t) = t - \lambda$.

例 6.10 设 $\mathcal{A}$ 是幂等算子, $\mathcal{A} \neq \mathcal{O}$, $\mathcal{A} \neq \mathcal{E}$. 则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) = t^2 - t = t(t-1)$. 设 $\mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{y}$, 其中 $\mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A})$, $\mathbf{y} \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$ *(见例 6.3)* 再设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$. 则 $\mathcal{A}(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$ 且 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$. 故 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}(t) = t(t-1)$.

例 6.11 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 是幂零算子. 则 $\mu_{\mathcal{A}}(t) = t^k$, 其中 k 是某个正整数. 设 $\mathbf{v} \notin \ker(\mathcal{A}^{k-1})$. 则 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}} = t^k$.

7 特征向量和特征值

在本节中, V 是域 F 上的有限维线性空间且 $\dim(V)>0$.

7.1 特征向量

定义 7.1 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$. 如果 $\langle \mathbf{v} \rangle$ 是 $\mathcal{A}$ 子空间, 则称 $\mathbf{v}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征向量 *(eigenvector)*.

命题 7.2 设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$, $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$. 则下列结论等价:

(i) $\mathbf{v}$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征向量;

(ii) $\mathcal{A}(\mathbf{v}) \in \langle \mathbf{v} \rangle$;

(iii) 存在 $\lambda \in F$ 使得 $\mathcal{A}(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$.

证明. (i) $\Longrightarrow$ (ii) 显然.

(ii) $\Longrightarrow$ (iii) 因为 $\mathcal{A}(\mathbf{v}) \in \langle \mathbf{v} \rangle$, 所以存在 $\lambda \in F$ 使得 $\mathcal{A}(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$.

(iii) $\Longrightarrow$ (i) 设 $\mathbf{x} \in \langle \mathbf{v} \rangle$. 则存在 $\alpha \in F$ 使得 $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{v}$. 于是,

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}) = \mathcal{A}(\alpha \mathbf{v}) = \alpha \mathcal{A}(\mathbf{v}) = \alpha \lambda \mathbf{v} \in \langle \mathbf{v} \rangle \Longrightarrow \langle \mathbf{v} \rangle \text{ 是 } \mathcal{A} \text{ 不变的.} \quad \square$$

注解 7.3 可直接验证: $\mathbf{v} \in V$ 是线性算子 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ 的特征向量当且仅当 $\mu_{\mathcal{A},\mathbf{v}}$ 的次数等于 *1*.